

PN I.1. PROGRAMUL NAȚIONAL DE VACCINARE

A. Obiectiv:

Protejarea sănătății populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinarea:

1. populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;
2. grupelor populaționale la risc.

B. Activități:

1. vaccinarea populației la vârstele prevăzute în Calendarul național de vaccinare;
2. vaccinarea grupelor populaționale la risc.

C. Beneficiarii programului:

1. pentru activitatea prevăzută la titlul B punctul 1: copiii cu cetățenie română dobândită conform prevederilor Legii cetățeniei române nr. 21/1991, cu modificările și completările ulterioare;
2. pentru activitatea prevăzută la titlul B punctul 2: persoanele încadrabile într-una dintre grupele de risc care îndeplinesc una dintre următoarele cerințe:
 - 2.1. au domiciliul în România și au calitatea de asigurat în conformitate cu prevederile art. 222 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 - 2.2. au domiciliul în România și nu realizează venituri din muncă, pensie sau alte surse;
 - 2.3. sunt în tranzit pe teritoriul României și prezintă un risc epidemiologic.

CALENDARUL NATIONAL DE VACCINARE

VARSTA RECOMANDATA	TIPUL DE VACCINARE	COMENTARIU
Primele 24 de ore 2 – 7 zile	Vaccin hepatitic B (Hep B)* ¹ Vaccin de tip Calmette Guerrin (BCG)	In maternitate
2 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
4 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
11 luni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Vaccin pneumococic conjugat* ²	Medic de familie
12 luni	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	Medic de familie
5 ani	Vaccin rujeolic-rubeolic-oreion (ROR)	Medic de familie
6 ani	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic (DTPa-VPI)	Medic de familie
14 ani	Vaccin diftero-tetanic pentru adulți/ vaccin diftero- tetano-pertussis acelar	Medic de familie

*¹ În situația în care vaccinul hepatitic B nu este disponibil pentru administrare în primele 24 de ore de la naștere, copiilor născuți din mame AgHBs pozitive li se va aplica temporar următoarea schemă de vaccinare:

VARSTA RECOMANDATA	TIPUL DE VACCINARE	COMENTARIU
6 săptămâni	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Doza I	Medic de familie
30 de zile de la prima doza	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Doza II	Medic de familie
30 de zile de la a doua doza	Vaccin diftero-tetano-pertussis acelar- poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa- VPI-Hib-Hep. B) Doza III	Medic de familie

La vârsta de 11 luni copiii vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare, respectiv vor primi a IV-a doză de vaccin diftero-tetano-pertussis acelar-poliomielitic-Haemophilus B-hepatitic B (DTPa-VPI-Hib-Hep. B). Copiii născuți din mame AgHBs negative vor fi vaccinați conform Calendarului național de vaccinare începând cu vârsta de 2 luni, fără a mai fi necesară recuperarea dozei de vaccin hepatitic B care nu a fost administrată la naștere.

*² Vaccinul pneumococic conjugat va fi inclus în calendarul național de vaccinare în funcție de fondurile disponibile.

Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi de unică folosință.