

- Vaccinarea anti-HPV este una dintre cele mai importante măsuri de protecție pe termen lung pentru sănătatea copilului dvs.
- Virusul papiloma uman (HPV) reprezintă o familie frecvent întâlnită de virusuri. Infecția cu HPV este cea mai frecventă infecție cu transmitere sexuală și prin contact direct al pielii. Unele tipuri de HPV pot provoca veruci genitale, în timp ce altele (tipurile cu risc înalt) pot duce, dacă nu sunt tratate, la diverse forme de cancer.
- Vaccinarea anti-HPV protejează atât fetele, cât și băieții împotriva verucilor și a majorității cancerelor provocate de infecția HPV.

Adresați-vă medicului de familie pentru mai multe informații și pentru a solicita rețeta pentru vaccinarea anti-HPV!

- În România, vaccinarea anti-HPV este :**
- **gratuită pentru fetele și băieții cu vârste între 11 și 26 de ani**
 - **compensată în proporție de 50% pentru femeile cu vârsta între 27 și 45 de ani.**

Material realizat în cadrul subprogramului de evaluare și promovare a sănătății și educație pentru sănătate al Ministerului Sănătății – pentru distribuție gratuită

17 noiembrie

Ziua de acțiune pentru eliminarea cancerului de col uterin

Acționează ACUM!



Ghid pentru părinți.
Ce trebuie să știți despre vaccinarea împotriva HPV a copilului dvs.



MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII

insp.gov.ro



INSP

Ce trebuie să știi despre HPV

- Virusul papiloma uman (HPV) este o familie comună de virusuri.
- Există peste 200 de tipuri de HPV. Unele produc infecții ale pielii, iar altele infectează mucoasele din diverse zone ale corpului.
- Majoritatea adulților se vor infecta cel puțin o dată în viață cu una, două, sau mai multe tulpini HPV.
- Infecția cu HPV se produce în 80% din cazuri imediat după debutul vieții sexuale.
- În 90% din cazuri infecția se vindecă de la sine, fără semne și simptome și fără urmări.
- În anumite cazuri HPV nu se elimină și infecția persistă mai mult de 1-2 ani.

Cât de gravă este infecția cu HPV?

- Diferitele tipuri de HPV afectează organismul în moduri diferite.
- Unele tulpini, de risc scăzut, produc veruci (negi) genitale.
- Alte tulpini HPV, de risc înalt, pot produce cancer de col uterin și alte tipuri de cancer, vulvar, vaginal, anal, penian și orofaringian.
- Peste 90% din cancerele de col uterin sunt produse de infecția persistentă cu HPV.
- Infecția cu HPV afectează atât fetele, cât și băieții.
- 4 din 10 cancere asociate infecției cu HPV se produc la bărbați.

Ce trebuie să știi despre vaccinul HPV

- Vaccinul HPV protejează împotriva a 90% din cancerele asociate infecției cu HPV și împotriva verucilor genitale și a leziunilor precanceroase.
- Pentru eficiență maximă, vaccinarea este recomandată înainte de debutul vieții sexuale.
- Vaccinul generează o imunitate mai puternică împotriva infecției atunci când este administrat la vârste mai mici, comparativ cu vârstele mai mari.
- Nu este necesară efectuarea unui test HPV înainte de vaccinare.
- Administrarea vaccinului nu influențează și nu favorizează comportamente sexuale timpurii.

Unde vă adresați pentru vaccinare HPV

- Vaccinul se eliberează în farmacii pe baza rețetei medicale de la medicul de familie sau orice medic specialist în contract cu casa de asigurări de sănătate.
- Administrarea vaccinului este realizată de medicii vaccinatori — medici de familie, specialiști în pediatrie, epidemiologie, boli infecțioase, precum și alți specialiști care dețin atestat de vaccinologie

Vaccinul anti-HPV este sigur și eficient și poate fi administrat începând cu vârsta de 11 ani.